

VAH

RKI

IHO

## Kéz- és bőrfertőtlenítés

# DESCODERM

## Alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítő 2- Propanol 70 % (V/V)

- Baktericid, yeasticid, tuberkulocid
- Szelektív virucid
- Illatanyagmentes, és allergizáló összetevőktől mentes



### Termékismertető

#### Készítmény típusa

Alkoholos, parfümmentes fertőtlenítőszer kézbe, illetve bőrbre való bedörzsölésre. A készítmény nem tartalmaz felhalmozódó, hosszú ideig aktív hatóanyagokat és egyéb összetevőket, ezért különösen bőrbarát. Dermatológiailag ajánlott kéz- és bőrfertőtlenítésre, allergiás és érzékeny bőrű személyeknek is.

#### Anyag- vagy jelzőcsoport

Fertőtlenítőszer

#### Az alkalmazás módja

A készítmény alkalmazható bőrbre történő bedörzsölésre és hűtőborogatás elkészítéséhez.

#### Alkalmazási területek

Higiénés és műtéti kézfertőtlenítésre (sebészi bemosakodásra), valamint injekciók és perifériás erek szúrása előtti bőrfertőtlenítésre, operációk és perifériás ízületek punkciói előtti bőrfertőtlenítésre, faggyúmirigyekben gazdag bőr fertőtlenítésére, valamint hűtőborogatáshoz.

#### Hatásspektrum

- baktericid (MRSA)
- yeasticid
- tuberkulocid
- szelektív virucid (HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV, Rota vírus inaktiváló hatású)

#### Összetétel

##### 100 g oldat tartalmaz:

Hatóanyag: 63,1 g propan-2-ol  
Egyéb összetevők: tisztított víz

Antimikrobiális hatásspektrum és behatási idők			15 mp	30 mp	1 perc	1,5 perc	3 perc
<b>Kézfertőtlenítés</b>							
Higiénés kézfertőtlenítés*	EN 1500 / VAH			■			
Műtéti kézfertőtlenítés/ sebészi bemosakodás*	EN 12791 / VAH					■	
Higiénés kézfertőtlenítés járvány esetén az IfSG szerint	RKI / DVV	Hatékony tartomány A		■			
Tuberkulocid (M. terrae)	EN 14348	Alacsony és nagy terhelés esetén	■				
Mycobactericidal (M. avium és M. terrae)	EN 14348	Alacsony és nagy terhelés esetén		■			
<b>Bőrfertőtlenítés</b>							
Bőrfertőtlenítés injekciózás és punkciók előtt*	VAH		■				
Bőrfertőtlenítés műtétek előtti, ízületek, testnyílások és üreges szervek punkciói előtt*	VAH				■		
Bőrfertőtlenítés faggyúmirigyekben gazdag bőr esetén*	VAH						■
<b>Virucid hatás</b>							
Hatékony minden burkos vírus ellen (szelektív virucid)	RKI/DVV szerint	Beleértve HBV/HIV/HCV	■				
Hatékony minden burkos vírus ellen	EN 14476 **	Beleértve HBV/HIV/HCV	■				
Rota-vírus	EN 14476	Alacsony és nagy terhelés esetén	■				
Noro-vírus (MNV)	EN 14476	Alacsony és nagy terhelés esetén			■		

\* beleértve a 2. fázisú 1. és 2. fázisú 2. szintű tesztek (mennyiségi szuszpenziós kísérletek és gyakorlati csirahordozó kísérletek)

\*\* az EN 14476 szerint, tesztvírus MVA (Vaccinia-vírus)



DR. SCHUMACHER  
SZÉT MAGYARORSZÁG KFT.

Dr Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. Iroda, postacím: 1037 Budapest, Jablonka út 71.  
Raktár: 1037 Budapest, Szőlőkert köz 9. Telefon: 36 (1) 278 0837 Fax: 36 (1) 278 0838  
E-mail: info@drschumacher.hu web: www.drschumacher.hu



DR. SCHUMACHER

# Kéz- és bőrfertőtlenítés

## DESCODERM

### Alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítő

EN szerinti kiegészítő vizsgálati eredmények			15 mp
Baktericid	EN 13727	Alacsony és nagy terhelés esetén	●
Yeasticid (Candida albicans)	EN 13624	Alacsony és nagy terhelés esetén	●

#### Felhasználás

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni száraz kézbe, bőrre dörzsölve.

**Higiénés kézfertőtlenítés:** Szükség szerint, kb. 1,5-3 ml készítményt a tenyérbe juttatunk, majd 30 másodpercig alaposan eldörzsöljük a kézen.

**Műtéti kézfertőtlenítés:** Az ún. tisztasági kézmosás után az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkaron. A műveletet még négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodás ideje: 5x1 perc=5 perc. A bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer-mennyiség: 5x5 ml=25 ml.

Abban az esetben, ha a bemosakodást megelőző tisztasági kézmosás után kéztörölés történik, akkor a száraz kézre min. 5 ml kézfertőtlenítő szert adagolunk, melyet a kézen és az alkaron 1,5\*\* percig alaposan eldörzsölünk, majd a műveletet megismételjük. Ebben az esetben a sebészi bemosakodás ideje: 2x1,5 perc=3 perc. A bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer-mennyiség: 2x5 ml=10 ml.

#### Bőrfertőtlenítés:

Injekciók, vérvétel előtt a kezelendő bőrfelületre juttatjuk a készítményt, majd 15-30 másodpercig hagyjuk hatni.

Punkciók előtt, valamint a műtéti bőrfelület fertőtlenítésénél a behatási idő minimálisan 1 perc, műtéti bőrfertőtlenítésnél a kezelést megismételjük.

Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületeken a behatási idő minimum 10 perc\*\*\*.

**Hűtőborogatás** esetén az oldatot egyenlő mértékben vízzel fel kell hígítani

\*VAH tanúsítvány szerint igazolt

1,5 perces behatási idő

\*\*VAH tanúsítvány szerint

megerősítve a 3 perces aktív idő

#### Ellenjavallat

A **Descodermet** nyílt sebek esetén tilos alkalmazni.

#### Gyógyszerköölcsönhatások

Nem ismert.

#### Mellékhatások

A készítmény alkalmazása során bőrpír és enyhe fokú égető érzés léphet fel.

#### A mellékhatásokról szóló jelentés

Ha bármilyen mellékhatást észlel, értesítse kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez vonatkozik a nem felsorolt mellékhatásokra is. A mellékhatásokat közvetlenül is bejelentheti az Országos Gyógyszerészeti és Egészségügyi Intézet (OGYÉI, [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)) felé is. A bejelentéssel segíti a gyógyszerek nemkívánatos hatásaival kapcsolatos új információk felderítését, és hozzájárul a gyógyszerek biztonságosabb használatához.

#### Speciális információk

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Ne alkalmazzuk nyálkahártyán, és szem környéki bőr fertőtlenítésére. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni. Orvosi tanácsadás esetén, vigye magával a készítmény címkéjét, csomagolását.

#### Szállítási egységek

Termék	Kiszerezési egység	Szállítási egység
<b>DESCODERM</b>	Szórófejes flakon, 250 ml	30 x 250 ml
	Flakon, 500 ml	20 x 500 ml
	Flakon, 1 L	12 x 1 L
	Kanna, 5 L	3 x 5 L
<b>Adagoláshoz</b>	Adagolópumpa 500 ml-es és 1000 ml-es flakonhoz	1 db
	Adagolópumpa (30 ml), 5 L-es kannához	1 db
	Kannacsap	1 db
<b>Tartozékok</b>	Kannakulcs	1 db

Az edényt tartsa szorosan lezárva. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ országos előírásoknak (meghatározandó) megfelelően. Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, nyílt lángtól és hőforrástól távol kell tartani. Előírt tárolás mellett gyártástól számított 3 év eltartható. Ne használja a lejáratú idő után.

#### Forgalomba hozatali információk

Az AMG (Német Gyógyszer törvény) szerint Németországban engedélyezett. Zul.-Nr. 1599.98.99.

#### Gyártja

Dr. Schumacher GmbH. Malsfeld, Németország

#### Forgalmazza

Dr Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

#### Engedélyek

OTH engedély: engedélyköteles OKBI bejelentés: bejelentés köteles OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI bejelentés köteles  
Az információ állapota: 8/2016

